

【レジメン概要】

|                       |              |    |               |              |     |
|-----------------------|--------------|----|---------------|--------------|-----|
| 適応病名<br>(癌腫)          | 結腸・直腸癌       |    | レジメン名<br>(略号) | FOLFIRI+PANI |     |
| インターバル/<br>使用コース数(標準) | 投与日(d1,d8など) |    | d1            |              |     |
|                       | 休薬日数         | 13 | 日間            | コース(サイクル)    | 14日 |

【抗がん剤 投与内容】

| Rp | 薬剤        | 催吐<br>リスク | 投与ルート | 投与量                   | 投与時間・<br>投与速度 | 投与日  |
|----|-----------|-----------|-------|-----------------------|---------------|------|
| 1  | パニツムマブ    | 最小度       | 中心静脈  | 6mg/kg                | 60分           | d1   |
| 2  | イリノテカン    | 中等度       | 中心静脈  | 150mg/m <sup>2</sup>  | 120分          | d1   |
| 3  | レボホリナート   |           | 中心静脈  | 200mg/m <sup>2</sup>  | 120分          | d1   |
| 4  | 5FU bolus | 軽度        | 中心静脈  | 400mg/m <sup>2</sup>  | 15分           | d1   |
| 5  | 5FU       | 軽度        | 中心静脈  | 2400mg/m <sup>2</sup> | 46時間          | d1-3 |